

مستشفى الملك فهد الجامعي King Fahad Hospital The University

## تعلیمات و إرشادات هامة Patient Preparation and Instructions

## تحليل تحمل السكر:

- 1 يتناول المريض وجبة غنية بالكربوهيدرات لمدة 3-2 أيام قبل التحليل.
- يصوم المريض لمدة اثنتي عشر ساعة ثم يتم سحب عينة دم ويطلب من المريض أن يجمع عينة بول.
  - 3 يتم إعطاء المريض شراب سكر مركز.
- بعد مرور ساعة يتم سحب عينة دم ويطلب من المريض أن يجمع عينة بول (تكرر هذه العملية لمدة ثلاث ساعات).
  - جب على المريض عدم بذل اي جهد، كما يجب عليه الامتناع عن التدخين خلال فترة التحليل.

## ORAL GLUCOSE TOLERANCE TEST (OGTT):

- 1 Patient should be on a high carbohydrate diet 2-3 days before testing.
- The patient must be fasting for 12 hours, then blood sample will be withdrawn and the patient should collect urine sample.
- 3 The patient will be given a formulated glucose solution.
- Blood sample will be withdrawn after one hour and the patient should collect urine sample (This process will be repeated for three hours).
- The patient should rest and should not smoke during this test.

وحدة التوعية الصحية Health Awareness Unit